

הודים

13/01/2025

תכנית הזנה עתירה להודים

נתרן %	זרחן כללי %	סידן %	אפר %	שומן %	חלבון %	צורה	יעוד	קוקסידיוסטט	תערובת
0.18	0.8	1.5	7	4	27	ח"מ 2.5	פריסטרטר	+	3512
0.17	0.8	1.4	7	5	25	ח"מ 2.5	סטרטר	+	3522
0.17	0.7	1.3	6	6	22	ח"מ 3.5	מעבר	+	3534
0.16	0.6	1.2	5	7	20	ח"מ 3.5	גידול	+	3544
0.16	0.6	1.2	5	7	20	ח"מ 3.5	גידול	-	3584
0.16	0.5	1	4.5	7	18	ח"מ 3.5	פיטום 1	-	3554
0.15	0.5	0.9	4	7	16	ח"מ 3.5	פיטום 2	-	3564
0.15	0.5	0.8	4	7	15	ח"מ 3.5	גמר	-	3574

3474	3464	3454	3484	3444	3434	3522	3512	
19 שיווק	16-18	13-15	11--12	10	7--9	4--6	0--3	גיל (שב')
	12.5	11	6.2	2.7	6.2	3.3	0.97	כמות (ק"ג לעוף)

תכנית הזנה - זכר




תכנית הזנה - נקבה



3464	3454	3484	3444	3434	3522	3512	
16+	13-15	11--12	10	7--9	4--6	0--3	גיל (שב')
	8.7	5	2.1	5	2.8	0.88	כמות (ק"ג לעוף)

ניתן להזמין תערובות 3522 גם בכופתיות 4 מ"מ, מספרה הוא 3524.
 • תערובות 3512, 3522, 3534, 3544 מכילות קוקסידיוסטט, זמן המתנה לפני שחיטה - 5 ימים.
 • במקרים של בעיות בריאות בלהקה, פיגורי גדילה וירידה בצריכת המזון רצוי להתייעץ לגביי המעבר בין התערובות והתאמת כמויות המזון.
 • רצוי לשמור דוגמת תערובת של 1 ק"ג מכל משלוח המגיע למשק.
 • כמויות המזון בגמר עד השיווק יותאמו לפי מועדי השיווק המתוכננים,
 בתקופה זו צריכת המזון היומית לנקבה היא כ- 0.430 ק"ג ולזכר כ- 0.640 ק"ג.



הודים

13/01/2025

תכנית הזנה רגילה להודים

נתרן %	זרחן כללי %	סידן %	אפר %	שומן %	חלבון %	צורה	יעוד	קוקסידיוסטט	תערובת
0.18	0.8	1.5	7	4	27	ח"מ 2.5	פריסטרטר	+	3512
0.17	0.8	1.4	7	5	25	ח"מ 2.5	סטרטר	+	3522
0.16	0.7	1.2	6	5.5	22	ח"מ 3.5	מעבר	+	3534
0.15	0.6	1.1	5	6.5	20	ח"מ 3.5	גידול	+	3544
0.15	0.6	1.1	5	6.5	20	ח"מ 3.5	גידול	-	3584
0.15	0.5	1	4.5	6.5	18	ח"מ 3.5	פיטום 1	-	3554
0.14	0.5	0.9	4	6.5	16	ח"מ 3.5	פיטום 2	-	3564
0.14	0.4	0.8	3.5	7	15	ח"מ 3.5	גמר	-	3574

3474	3464	3454	3484	3444	3434	3522	3512	
19 שיווק	16-18	13-15	11--12	10	7--9	4--6	0--3	גיל (שב')
	12.5	11	6.2	2.7	6.2	3.3	0.97	כמות (ק"ג לעוף)

תכנית הזנה - זכר



תכנית הזנה - נקבה



3464	3454	3484	3444	3434	3522	3512	
16+	13-15	11--12	10	7--9	4--6	0--3	גיל (שב')
	8.7	5	2.1	5	2.8	0.88	כמות (ק"ג לעוף)

ניתן להזמין תערובות 3522 גם בכופתיות 4 מ"מ, מספרה הוא 3524.
 • תערובות, 3512, 3522, 3534, 3544 מכילות קוקסידיוסטט, זמן המתנה לפני שחיטה - 5 ימים.
 • במקרים של בעיות בריאות בלהקה, פיגורי גדילה וירידה בצריכת המזון רצוי להתייעץ לגביי המעבר בין התערובות והתאמת כמויות המזון.
 • רצוי לשמור דוגמת תערובת של 1 ק"ג מכל משלוח המגיע למשק.
 • כמויות המזון בגמר עד השיווק יותאמו לפי מועדי השיווק המתוכננים, בתקופה זו צריכת המזון היומית לנקבה היא כ- 0.430 ק"ג ולזכר כ- 0.640 ק"ג.

