



הודים

13/01/2025

תכנית הזנה רגילה להודים

תערובת	קוקסידיוסטאט	יעוד	צורה	חלבון (%)	שומן (%)	אפר (%)	סידן (%)	זרחן כללי (%)	נתרן (%)
3512	+	פריסטרטר	מ"מ 2.5	27	4	7	1.5	0.8	0.18
3522	+	סטרטר	מ"מ 2.5	25	5	7	1.4	0.8	0.17
3434	+	מעבר	מ"מ 3.5	22	5.5	6	1.2	0.7	0.16
3444	+	גידול	מ"מ 3.5	20	6.5	5	1.1	0.6	0.15
3484	-	גידול	מ"מ 3.5	20	6.5	5	1.1	0.6	0.15
3454	-	פיטום 1	מ"מ 3.5	18	6.5	4.5	1	0.5	0.15
3464	-	פיטום 2	מ"מ 3.5	16	6.5	4	0.9	0.5	0.14
3474	-	גמר	מ"מ 3.5	15	7	3.5	0.8	0.4	0.14

3474	3464	3454	3484	3444	3434	3522	3512	
19 שיווק	16-18	13-15	11--12	10	7--9	4--6	0--3	גיל (שב')
	12.5	11	6.2	2.7	6.2	3.3	0.97	כמות (ק"ג לעוף)

תכנית הזנה - זכר



תכנית הזנה - נקבה



3464	3454	3484	3444	3434	3522	3512	
16+	13-15	11--12	10	7--9	4--6	0--3	גיל (שב')
	8.7	5	2.1	5	2.8	0.88	כמות (ק"ג לעוף)

ניתן להזמין תערובות 3522 גם בכופתיות 4 מ"מ, מספרה הוא 3524.
 • תערובות 3512, 3522, 3434, 3444, מכילות קוקסידיוסטט,
 זמן המתנה לפני שחיטה - 5 ימים.
 • במקרים של בעיות בריאות בלהקה, פיגורי גדילה וירידה בצריכת המזון רצוי להתייעץ לגביי המעבר בין התערובות והתאמת כמויות המזון.
 • רצוי לשמור דוגמת תערובת של 1 ק"ג מכל משלוח המגיע למשק.
 • כמויות המזון בגמר עד השיווק יותאמו לפי מועדי השיווק המתוכננים,
 בתקופה זו צריכת המזון היומית לנקבה היא כ- 0.430 ק"ג ולזכר כ- 0.640 ק"ג.



הודים

13/01/2025

תכנית הזנה עתירה להודים

תערובת	קוקסידיוסטאט	יעוד	צורה	חלבון (%)	שומן (%)	אפר (%)	סידן (%)	זרחן כללי (%)	נתרן (%)
3512	+	פריסטרטר	מ"מ 2.5	27	4	7	1.5	0.8	0.18
3522	+	סטרטר	מ"מ 2.5	25	5	7	1.4	0.8	0.17
3534	+	מעבר	מ"מ 3.5	22	6	6	1.3	0.7	0.17
3544	+	גידול	מ"מ 3.5	20	7	5	1.2	0.6	0.16
3584	-	גידול	מ"מ 3.5	20	7	5	1.2	0.6	0.16
3554	-	פיטום 1	מ"מ 3.5	18	7	4.5	1	0.5	0.16
3564	-	פיטום 2	מ"מ 3.5	16	7	4	0.9	0.5	0.15
3574	-	גמר	מ"מ 3.5	15	7	4	0.8	0.5	0.15

3574	3564	3554	3584	3544	3534	3522	3512	
19 שיווק	16-18	13-15	11--12	10	7--9	4--6	0--3	גיל (שב')
	12.5	11	6.2	2.7	6.2	3.3	0.97	כמות (ק"ג לעוף)

תכנית הזנה - זכר



תכנית הזנה - נקבה



3564	3554	3584	3544	3534	3522	3512	
16+	13-15	11--12	10	7--9	4--6	0--3	גיל (שב')
	8.7	5	2.1	5	2.8	0.88	כמות (ק"ג לעוף)

ניתן להזמין תערובות 3522 גם בכופתיות 4 מ"מ, מספרה הוא 3524.
 • תערובות 3512, 3522, 3534, 3544, מכילות קוקסידיוסטט,
 זמן המתנה לפני שחיטה - 5 ימים.
 • במקרים של בעיות בריאות בלהקה, פיגורי גדילה וירידה בצריכת המזון רצוי להתייעץ לגביי המעבר בין התערובות והתאמת כמויות המזון.
 • רצוי לשמור דוגמת תערובת של 1 ק"ג מכל משלוח המגיע למשק.
 • כמויות המזון בגמר עד השיווק יותאמו לפי מועדי השיווק המתוכננים,
 בתקופה זו צריכת המזון היומית לנקבה היא כ- 0.430 ק"ג ולזכר כ- 0.640 ק"ג.